



※ 의약품을 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

#### 일반의약품

## 포리부틴® 정

(트리메부틴말레산염) 100mg, 150mg PB01001-2020-1

#### 【원료약품의 분량】

- 포리부틴®정 (100mg) (1정 중)  
유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) ..... 100mg  
첨가제 : 밀전분, 분말셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스 카르멜로오스나트륨, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨
- 포리부틴®정 150mg (1정 중)  
유효성분 : 트리메부틴말레산염(KP) ..... 150mg  
첨가제 : 밀전분, 분말셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 콜로이드성이산화규소, 크로스 카르멜로오스나트륨, 포비돈, 히드록시프로필셀룰로오스, D-만니톨

#### 【성 상】 흰색의 원형 정제

	외 형		
	앞 면	뒷 면	측 면
포리부틴®정(100mg)			
포리부틴®정 150mg			

#### 【효능·효과】

- 주요능·효과
  - 식도역류 및 열공(구멍)헤르니아(탈장), 위·십이지장염, 위·십이지장궤양에 있어서의 소화기능이상(복통(배아픔), 소화불량, 구역, 구토)
  - 과민성대장증후군 및 경련성 결장
  - 소아 질환 : 습관성 구토, 비감염성 장관(창자)통과장애(변비, 설사)

#### 【용법·용량】

성인 : 트리메부틴말레산염으로서 1회 100~200mg 1일 3회 식전에 경구투여한다(복용한다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감한다.

#### 【사용상의 주의사항】

- 이상반응
  - 소화기계 : 드물게 변비, 설사, 복명(창자 가스소리), 구역, 구토, 소화장애, 구갈(목 마름), 구내마비감 등이 나타날 수 있다.
  - 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
  - 정신신경계 : 드물게 피로감, 졸음, 현기(어지러움), 권태감, 두통등이 나타날 수 있다.
  - 간장 : 드물게 GOT, GPT상승이 나타날 수 있다.
  - 과민증 : 드물게 발진 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 임부에 대한 투여  
임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 수유부에 대한 투여  
수유중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 수유중인 부인에는 투여를 피하고 부득이 투여시는 수유를 중지한다.



PB01001-2020-1

【포장단위】 30정(병), 500정(병)

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말고, 뚜껑을 꼭 닫아서 보관하십시오.
- ※ 사용기한 경과한 제품은 복용하지 마시기 바랍니다.
- ※ 제품 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
- ※ 제품이 든 용기에 충격이 가해질 경우 정제가 파손될 수 있으므로 주의하시기 바랍니다.

\* 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.

♣ 소비자상담전화 : 080-520-3131

♣ 홈페이지 : [www.samil-pharm.com](http://www.samil-pharm.com) 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)

\* 부작용보고 및 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」



첨부문서 작성(개정)일 : 2020년 8월 31일

제조판매원  삼일제약|주  
경기도 안산시 단원구 산단로 216 (원시동)

기술제휴  Pfizer Pharmaceuticals  
235 East 42nd St New York 10017-5755 USA