

※ 의약품 사용하기 전 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

일반의약품

나박

점안액

(엔-아세틸아스파틸글루타민산나트륨) XN01501-2019-2

【원료약품의 분량】 1mL 중
유효성분 : 엔-아세틸아스파틸글루타민산나트륨(별규)(무수물로서) 49mg
첨가제 : 수산화나트륨, 염산, 주사용수

【성 상】 흰색의 불투명한 아백(ABAK[®]FS)용기에 들어있는 보존제가 없는 무색, 투명한 무취의 점안액

【효능·효과】 알레르기성 결막염 및 안검(눈꺼풀)결막염

【용법·용량】 1회 1방울 1일 2~6회 점안(눈에 넣음)한다. 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

- 1. 이상반응**
점안(눈에 넣음) 시 때때로 일시적인 작열감(화끈감) 또는 자각감이 나타날 수 있다.
- 2. 일반적주의**
1) 심한 알레르기성 결막염에 부신(콩팥위생)피질호르몬제 투여를 필요로 하는 경우에는 이 약과 부신(콩팥위생)피질호르몬제를 교대로 투여한다.
2) 증상이 완화된 이후에도 알레르기 유발 위험이 있는 기간동안에는 계속 투여한다.
- 3. 임부 및 수유부에 대한 투여**
임부 및 수유부의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
- 4. 소아에 대한 투여**
4세 이하의 유아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다.
- 5. 적용상의 주의**
1) 점안(눈에 넣음)용으로만 사용한다.
2) 점안(눈에 넣음) 시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
3) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
4) 개봉 후 8주 이내에 사용한다.
- 6. 저장상의 주의사항**
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관한다.
3) 오염(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법】 기밀용기, 25℃이하 보관

【사용기간】 제조일로부터 24개월

【포장단위】 10mL/병

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마시기 바랍니다.
- ※ 제품 취급시 포장재(용기, 케이스)에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의 하시기 바랍니다.
- ※ 점안(눈에 넣음) 시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 최소 5mm이상 떨어진 위치에서 점적하십시오.
- ※ 다른 사람들과 함께 사용하지 마십시오.

* 이 첨부문서 작성(개정)일 이후 변경된 내용은 다음에서 확인하실 수 있습니다.
 ● 소비자상담전화 : 080-520-3131
 ● 홈페이지 : www.samil-pharm.com 또는 의약품통합정보시스템(<http://nedrug.mfds.go.kr>)
 * 부작용보고 및 부작용 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

「변질·변패 되었거나 사용기한이 경과한 제품을 구입하셨을 경우에는 구입처를 통하여 직접 교환하여 드립니다.」

첨부문서 작성(개정)일 : 2019년 12월 17일

제조의뢰자 Laboratoires Théa
12, Rue Louis Blériot-63017, Clermont-Ferrand, Cedex 2, France

제조사 Laboratoires Excelvision
Rue de la Lombardiere, 07100 Annonay, France

수입·판매원 **Samil** 삼일제약주
서울특별시 서초구 효령로 155 (방배동)

00000000

N455C10KOR/1019